PUBLICATION MENSUELLE DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE

www.larevuedupraticien.fr

larevuedupraticien

SUPPLÉMENT AU N° 3
MARS 2013
TOME 63

LES CAHIERS DU MÉDICAMENT

SOMMAIRE/*SUMMARY*

Revue de presse
S1 ▫ Prévenir les intoxications au paracétamol
Richard Delarue

Bon usage du médicament
S2 ▫ La fiche BUM de la Commission de la transparence

À propos d'une synthèse d'avis de la Commission de la transparence
S4 ▫ L'éculizimab a révolutionné le pronostic du syndrome hémolytique et urémique atypique
Christophe Legendre

Actualité du médicament
S6 ▫ Extraits des récents points d'information de l'Ansm
S7 ▫ Derniers avis de la Commission de la transparence

Press review
S1 ▫ Prevent paracetamol poisoning
Richard Delarue

Proper use of medication
S2 ▫ Jevtana and Zytiga. Transparency Committee

About a decision of the Transparency Committee
S4 ▫ Eculizimab has revolutionized the prognosis of atypical HUS
Christophe Legendre

News of medication
S6 ▫ Excerpts from ANSM
S7 ▫ Last decisions of the Transparency Committee

revue de presse

Prévenir les intoxications au paracétamol

Le surdosage, volontaire ou accidentel, en paracétamol est cause d'hépatotoxicité pouvant aboutir au décès ou à la nécessité d'une transplantation hépatique en urgence.

Au Royaume-Uni, à partir de 1998, la législation a introduit l'obligation de limiter le contenu des boîtes de paracétamol à 8 g pour les boites en vente libre et 16 g pour celles en vente en pharmacie.

Avec un recul prolongé, cette étude[1] a confirmé les bénéfices de cette action de santé publique en montrant une diminution des décès de 43 %, correspondant à 765 vies sauvées. Cette diminution a été plus marquée que celle affectant globalement les décès par intoxication médicamenteuse, confirmant le rôle direct du législateur dans cette amélioration.

La diminution du taux d'inscription sur la liste de transplantation hépatique en urgence ou la réalisation de transplantation dans cette indication a pourtant peu diminué.

Il n'en reste pas moins que le nombre de décès n'est pas négligeable et que d'autres efforts sont nécessaires, peut-être suggérés par cette étude. En effet, les décès liés à une intoxication par des médicaments contenant du paracétamol (mais pas uniquement) n'ont pas diminué.

Commentaires : cela soulève donc deux points, d'une part quel est le rapport intérêt/risque des associations contenant du paracétamol et un autre antalgique, d'autre part il serait logique que le conditionnement de ces médicaments suive les modifications instaurées en 1998 pour le paracétamol.

Richard Delarue

1. Hawton K, Bergen H, Simkin S, et al. Long term effect of reduced pack sizes of paracetamol on poisoning deaths and liver transplant activity in England and Wales: interrupted time series analysis. BMJ 2013;346:403-11.

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN